

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

<p>RADIOGRAPHIES DE L'EPAULE</p>

- Faces en rotation neutre, interne et externe,
- Profil de coiffe en rotation neutre (*Lamy*),
- Face vraie en décubitus dorsal (FVD) (*Railhac*).

= BILAN D'UNE EPAULE DOULOUREUSE
(tendinopathie de la coiffe +/- calcifiante,
rupture de coiffe)

Dr MD CHANCELIER

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

RADIOGRAPHIES DES DEUX EPAULES

- Faces en rotation neutre, interne et externe,
- Profil glénoïdien normal et dépassé comparatif (*Bernageau*)

Ou

Incidence apicale oblique (de *Garth*), si profil glénoïdien impossible.

= BILAN D'UNE EPAULE INSTABLE

RADIOGRAPHIES DE L' EPAULE

- Face,
- profil de coiffe
- Incidence apicale oblique (de *Garth*)

= EN URGENCE APRES REDUCTION

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

**RADIOGRAPHIES DE L'ARTICULATION
ACROMIO-CLAVICULAIRE**

- Cliché de face du cintre acromio-claviculaire, rayon ascendant de 15° comparatif
- Cliché de face du cintre acromio-claviculaire, rayon ascendant de 15° comparatif avec traction de 5kg.

- Cliché de face de l'articulation acromio-claviculaire, rayon ascendant de 30° (unilatéral),

RADIOGRAPHIES DE L'EPAULE

- Profil médical unilatéral (incidence dite de la sieste ou faux profil)
- Profil axillaire (appréciation antéro-postérieure)

= DISJONCTION ACROMIO-CLAVICULAIRE POST-TRAUMATIQUE
(d'après le protocole de WEBER et PATTE)

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

**RADIOGRAPHIES DE L'ARTICULATION
ACROMIO-CLAVICULAIRE**

- Cliché de face de l'articulation acromio-claviculaire, rayon ascendant de 30° (unilatéral),

RADIOGRAPHIES DE L'EPAULE

- Profil médical unilatéral (incidence dite de la sieste ou faux profil)

=PATHOLOGIE ACROMIO-CLAVICULAIRE
(arthrose, kyste acromio-claviculaire, osteolyse externe,)

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

RADIOGRAPHIES DE L'EPAULE

- Faces en rotation neutre, interne et externe,
- Profil de coiffe en rotation neutre (*Lamy*),
- Incidence de Bloom et Obatta ou axillaire couché pour étude du centrage antéro-postérieur

= BILAN ET SUIVI D'UNE OMARTHROSE CONNUE

Dr MD CHANCELIER

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

RADIOGRAPHIE DE LA CLAVICULE

Face rayon ascendant 30 DEGRES

= **BILAN fracture, consolidation...**

(Il n'existe pas de profil spécifique)

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

RADIOGRAPHIES DE L'ARTICULATION STERNO-COSTO-CLAVICULAIRE

En urgence

Face décubitus rayon ascendant de 40° (*Rockwood*)

Profil en incidence de *Heinig* couché (ou debout)

Ou scanner d'emblée

= SUSPICION DE LUXATION STERNO-CLAVICULAIRE

IMAGERIE MEDICALE
25 avenue de la providence
92160 ANTONY

25-10-2011

RADIOGRAPHIES DE L'ARTICULATION STERNO-COSTO-CLAVICULAIRE

Face prenant les deux articulations en procubitus rayon ascendant de 35°
Procubitus oblique de 20° droit et gauche rayon droit

Ou scanner

= DOULEURS STERNO-CLAVICULAIRES
(arthrose, arthropathie microcristalline ou inflammatoire...)

Dr MD CHANCELIER